

Exkursion till Skolänget i Vamlingbo lördagen den 10 juli 2022

Arton deltagare samlades utanför kyrkan i Vamlingbo, varefter vi förflyttade oss över landsvägen och vidare österut norr om den före detta skolan i socknen. Här breder ett i stort sett helt öppet änge ut sig i en svag sluttning mot ost. Vi följde här de slagna stigar som leder besökarna genom slättermarken. Eftersom torka och i slutet av juni detta år dessutom extrem värme påverkat växtligheten var flera arter överblommade och svårbestämda. Ett annat år rekommenderas därför ett tidigare besök.

Vi började med att gå mot sydost och noterade här bland annat stor kustruta *Thalictrum minus* ssp. *minus*, backklöver *Trifolium montanum*, äkta johannesört *Hypericum perforatum*, gulmåra *Galium verum*, äkta höskallra *Rhinanthus angustifolius* ssp. *grandiflorus* och svinrot *Scorzonera humilis*. Flockfibbla *Hieracium umbellatum* fanns i en slätteranpassad form endast 10 till 20 cm hög och redan delvis överblommad. Liknande former noterades för ängsvädd *Succisa pratensis*. I ett något fuktigare stråk var växtligheten mer högvuxen med arter såsom älggräs *Filipendula ulmaria*, sibirisk björnloka *Heracleum sphondylium* ssp. *sibiricum* och läkevänderot *Valeriana officinalis* samt gräsen luddtåtel *Holcus lanatus*, rörflen *Phalaris arundinacea* och rörsvingel *Schedonorus arundinaceus*.

Då vi svängde mer söderut blev växtligheten mer lågvuxen med ett flertal orkidéer, av vilka flera dock var överblommade. Vi kunde identifiera följande: skogsnycklar *Dactylorhiza maculata* ssp. *fuchsii*, kärknipprot *Epipactis palustris*, vanlig brudsporre *Gymnadenia conopsea* ssp. *conopsea*, tvåblad *Neottia ovata*, flugblomster *Ophrys insectifera*, nattviol *Platanthera bifolia* och grönvit nattviol *P. chlorantha*. Än mer lågvuxna var ormtunga *Ophioglossum vulgatum*, loppstarr *Carex pulicaris*, rosettjungfrulin *Polygala amarella*, blodrot *Potentilla erecta*, späd ögontröst *Euphrasia stricta* var. *tenuis* och liten blåklocka *Campanula rotundifolia*. I denna del fanns också flera nektarsökande fjärilar, bland annat sexfläckig bastardsvärmare.

I en något fuktigare del mot östra kanten fanns praktsporre *Gymnadenia conopsea* ssp. *densiflora* och vanlig backruta *Thalictrum simplex* ssp. *simplex*. Orkidélistan kompletterades i norra kanten med de helt överblommade och knappt identifierbara arterna krutbrännare *Neotinea ustulata* och johannesnycklar *Orchis militaris*. Att vi var ute i sista minuten för att njuta av detta änge noterade vi genom att slättern redan var påbörjad då vi närmade oss den före detta skolan. Som tack för ett välskött änge överlämnades ett exemplar av den nyligen utkomna *Gotlands orkidéer* till markägarna som hade tagit en paus i slätterarbetet.

Jörgen Petersson